

# לוגיקה מסדר ראשון

## תחשיב הפסוקים

- תחשיב הפסוקים הוא שפה המשמשת לתאור קשרים בין פסוקים.
- לכל פסוק יש ערך אמת - "אמת" או "שקר"
- דוגמאות לפסוקים:
  - אלון הוא מתרגל.
  - הלוח ירוק.
  - היום יום שבת.
  - חיזבאללה ירה רקטות על חיפה.

## פסוקים מורכבים

- ניתן לייצג טענות מורכבות על ידי שימוש בקשרים לוגיים כגון "או", "וגם", "לא", "ו"אם -- אז".

- דוגמאות:

– אם מחר ירד גשם, אז אני אקח מטריה.

– הקניון פתוח או שהיום יום שבת.

– הגשתי את תרגיל הבית וגם נשמעה אזעקה.

– לא התקיימה היום הרצאה.

## סימנים פורמאליים

- בלוגיקה פורמאלית, נשתמש בסימנים הבאים לייצג טענות:
  - אותיות לטיניות ( $A, B, C, \dots$ ) לציון טענות אטומיות כגון "דני הוא סטודנט".
  - סימני סוגריים לציון סדר הפעולות.
  - קשרים לוגיים:  $\neg$  לציון שלילה,  $\vee$  לציון "או",  $\wedge$  לציון "וגם" ו-  $\rightarrow$  לציון "אם-אז".

### • דוגמאות:

- $(A \rightarrow (B \vee C))$
- $((\neg B) \vee C) \rightarrow (A \wedge (\neg D))$
- $((A \wedge B) \rightarrow (A \vee B))$

## נוסחאות בנויות היטב

- נוסחא  $\varphi$  תקרא בנויה היטב אם היא מקיימת את אחד התנאים הבאים:

–  $\varphi \in \{A, B, C, \dots\}$  היא פסוק אטומי.

– נוסחאות  $\alpha, \beta$  הן בנויות היטב ומתקיים:  $\varphi = (\neg\alpha)$ ,

$\varphi = (\alpha \vee \beta)$ ,  $\varphi = (\alpha \wedge \beta)$  או  $\varphi = (\alpha \rightarrow \beta)$ .

## ערך האמת של פסוק

- השמה היא פונקציה המתאימה לכל פסוק אטומי ערך אמת.
- ערך האמת  $V$  של פסוק  $\varphi$  תחת השמה  $v$  מוגדר באופן רקורסיבי:
  - אם  $\alpha$  נוסחא אטומית אזי:
$$V(\alpha) = v(\alpha) *$$
  - אם  $\alpha = \neg\beta$  אזי  $V(\alpha)$  יקבע עפ"י טבלת האמת של  $\neg$  עבור  $V(\beta)$ .
  - אם  $\alpha = \beta \vee \gamma$  או  $\alpha = \beta \wedge \gamma$  או  $\alpha = \beta \rightarrow \gamma$  אזי  $V(\alpha)$  יקבע עפ"י טבלת האמת של הקשרים  $\rightarrow, \wedge, \vee$  בהתאמה עבור  $V(\beta)$  ו- $V(\gamma)$ .

# טבלאות האמת

$\alpha$	$\beta$	$\alpha \vee \beta$
<b>T</b>	<b>T</b>	<b>T</b>
<b>T</b>	<b>F</b>	<b>T</b>
<b>F</b>	<b>T</b>	<b>T</b>
<b>F</b>	<b>F</b>	<b>F</b>

$\alpha$	$\neg\alpha$
<b>T</b>	<b>F</b>
<b>F</b>	<b>T</b>

$\alpha$	$\beta$	$\alpha \rightarrow \beta$
<b>T</b>	<b>T</b>	<b>T</b>
<b>T</b>	<b>F</b>	<b>F</b>
<b>F</b>	<b>T</b>	<b>T</b>
<b>F</b>	<b>F</b>	<b>T</b>

$\alpha$	$\beta$	$\alpha \wedge \beta$
<b>T</b>	<b>T</b>	<b>T</b>
<b>T</b>	<b>F</b>	<b>F</b>
<b>F</b>	<b>T</b>	<b>F</b>
<b>F</b>	<b>F</b>	<b>F</b>

## טאוטולוגיות וסתירות

- פסוק  $\varphi$  יקרא טאוטולוגיה אם הוא מקבל ערך אמת TRUE תחת כל השמה  $v$ .
- פסוק  $\varphi$  יקרא סתירה אם הוא מקבל ערך אמת FALSE תחת כל השמה  $v$ .
- דוגמאות:

סתירות	טאוטולוגיות
$(A \wedge (\neg A))$	$A \rightarrow A$
$(A \wedge B) \wedge (\neg B)$	$(A \wedge B) \rightarrow (A \vee B)$
$\neg(A \vee (\neg A))$	$(A \vee (\neg A))$
	$A \rightarrow (A \vee B)$

## גרירה טאוטולוגית

- פסוק  $\alpha$  גורר טאוטולוגית פסוק  $\beta$  (סימון  $\alpha \models \beta$ ) אם מתקיים שהפסוק  $(\alpha \rightarrow \beta)$  הוא טאוטולוגיה.
- קבוצת פסוקים  $\Phi = \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$  גוררת טאוטולוגית פסוק  $\alpha$  (סימון  $\Phi \models \alpha$ ) אם מתקיים שהפסוק

$$((\varphi_1 \wedge (\varphi_2 \wedge \dots (\varphi_{n-1} \wedge \varphi_n) \dots)) \rightarrow \alpha)$$

הוא טאוטולוגיה.

## מערכת פעולות שלמה

- פסוקים  $\alpha$  ו- $\beta$  יקראו שקולים (סימון  $\alpha \Leftrightarrow \beta$ ) אם הפסוק  $(\alpha \rightarrow \beta) \wedge (\beta \rightarrow \alpha)$  הוא טאוטולוגיה.
- נשים לב שלכל פסוק קיים פסוק שקול לו, המכיל את הקשרים  $\rightarrow$  ו- $\neg$  בלבד, לפי השקילויות הבאות:
  - $\alpha \vee \beta \Leftrightarrow (\neg\alpha) \rightarrow \beta$
  - $\alpha \wedge \beta \Leftrightarrow \neg(\alpha \rightarrow (\neg\beta))$

## מערכת הוכחה לתחשיב הפסוקים

- בשלב זה נרצה לבנות מערכת אשר תאפשר לנו להוכיח טענות נכונות בתחשיב הפסוקים בצורה מכאנית על ידי פעולות עיבוד מחרוזות פשוטות על הפסוקים.
- מערכת זו מבוססת על אקסיומות (טענות שאנו מקבלים כנכונות), ועל כלל היסק המאפשר ליצור טענות נכונות חדשות מתוך האקסיומות.
- באמצעות מערכת ההוכחה נוכל למצוא טאוטולוגיות, ולבחון האם טענות מסויימות בהנתן ידע על העולם

## האקסיומות הלוגיות וכלל ניתוק הרישא

קבוצת האקסיומות הלוגיות בתחשיב הפסוקים היא קבוצת הפסוקים הבאה:

$$1. \alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$$

$$2. (\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$$

$$3. (\neg\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\neg\alpha \rightarrow \neg\beta) \rightarrow \alpha)$$

האקסיומות הנ"ל הינן סכימות של פסוקים. ניתן להציב כל נוסחא במקום  $\alpha, \beta, \gamma$  לעיל כדי לקבל נוסחת אקסיומה ספציפית.

כלל ההיסק בתחשיב הפסוקים הוא כלל ניתוק הרישא (Modus Ponens):

$$\frac{\alpha \quad \alpha \rightarrow \beta}{\beta}$$

משמעות הכלל היא שמ- $\alpha$  ו- $\alpha \rightarrow \beta$  נסיק  $\beta$ .

## הוכחה

- תהי  $\Phi$  קבוצת פסוקים ויהי  $\alpha$  פסוק. הוכחה של  $\alpha$  מתוך  $\Phi$  היא סדרה סופית ולא ריקה

$$\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n$$

של פסוקים המקיימת את שני התנאים הבאים:

– לכל  $k = 1, \dots, n$ :

\*  $\psi_k$  אקסיומה לוגית; או

\*  $\psi_k$  נוסחא ב- $\Phi$ ; או

\* קיימים  $i, j < k$  כך ש- $\psi_k = \psi_i = \psi_j$ .

–  $\psi_n = \alpha$

## משפטי הנאותות והשלמות

- אם קיימת הוכחה של  $\alpha$  מתוך  $\Phi$ , נאמר כי  $\alpha$  יכיח מתוך  $\Phi$  ונסמן  $\Phi \vdash \alpha$ .
- קיים קשר לא-טריביאלי בין יכיחות לבין גרירה טאוטולוגית:
  - משפט הנאותות: אם  $\Phi \vdash \alpha$  אזי גם  $\Phi \models \alpha$ . כלומר, כל מה שאפשר להוכיח הוא נכון.
  - משפט השלמות: אם  $\Phi \models \alpha$  אזי גם  $\Phi \vdash \alpha$ . כלומר, כל מה שנכון אפשר להוכיח.
- המשפטים הנ"ל מספקים קשר בין סינטקס לסמנטיקה ומהווים את ההצדקה לשימוש בהוכחה ככלי לקביעת נכונות טענות.

## תחשיב הפרדיקטים

- תחשיב הפרדיקטים היא שפה לייצוג טיעונים מורכבים על תכונות של עצמים בעולם.
- לטיעונים בתחשיב הפרדיקטים יש שני מרכיבים: עצמים ותכונות שמייחסים להם. התכונות נקראות פרדיקטים (יחסים).
- לדוגמא:
  - כל הלימונים צהובים.
  - אורי סטודנט.

## תחשיב הפרדיקטים (תחביר)

השפה מכילה:

1. סימני קבועים  $c_1, c_2, c_3, \dots$
2. סימני משתנים  $x_1, x_2, x_3, \dots$
3. לכל  $n$  טבעי קבוצה של סימני פונקציות  $n$ -מקומיות:  $f_1^n, f_2^n, f_3^n, \dots$
4. לכל  $n$  טבעי חיובי קבוצה של סימני פרדיקטים  $n$ -מקומיים:  
 $p_1^n, p_2^n, p_3^n, \dots$
5. קשרים לוגיים:  $\forall, \wedge, \rightarrow, \neg$ .
6. כמתים:  $\forall, \exists$ .

## תחשיב הפרדיקטים (תחביר) - המשך

נגדיר את אוסף שמות העצם (ביטויים) בשפה:

- קבועים.
- משתנים.
- אם  $t_1, t_2, \dots, t_n$  שמות עצם ו-  $f_k^n$  סימן פונקציה  $n$  מקומית, אזי  $f_k^n(t_1, t_2, \dots, t_n)$  הינו שם עצם.

נגדיר את אוסף הנוסאות:

- אם  $t_1, t_2, \dots, t_n$  הם שמות עצם, ו-  $p_k^n$  הוא סימן פרדיקט  $n$  מקומי, אזי  $p_k^n(t_1, t_2, \dots, t_n)$  נוסחא. נוסחא כנ"ל נקראת פסוק אטומי.
- תהי  $\alpha$  נוסחא, אזי  $\neg\alpha$  נוסחא.
- יהיו  $\alpha, \beta$  נוסחאות, אזי  $\alpha \vee \beta, \alpha \wedge \beta, \alpha \rightarrow \beta$  נוסחאות.
- תהי  $\alpha$  נוסחא ויהי  $x$  משתנה, אזי  $\exists x : \alpha, \forall x : \alpha$  נוסחאות.

## הצבה

הגדרות:

- משתנה קשור (bound) - משתנה המופיע בנוסחה עם כמת.  
דוגמא:  $\forall x : Apple(x) \rightarrow Red(x)$ .
- משתנה חופשי (free) - משתנה שאינו קשור.  
דוגמא:  $Apple(x) \rightarrow Red(x)$ .
- נוסחה תקרא פסוק אם לא מופיעים בה משתנים חופשיים.
- יהיו  $s$  ו- $t$  שמות עצם, יהי  $x$  משתנה, נגדיר את  $s(x|t)$  כשם העצם המתקבל מ- $s$  כאשר כל מופע של המשתנה  $x$  מוחלף ב- $t$ .
- תהי  $\alpha$  נוסחה ו- $t$  שם עצם, יהי  $x$  משתנה, נגדיר את  $\alpha(x|t)$  כנוסחה המתקבלת מ- $\alpha$  כאשר כל מופע חופשי של המשתנה  $x$  מוחלף בשם העצם  $t$ .

## האקסיומות הלוגיות

קבוצת האקסיומות הלוגיות של תחשיב הפרדיקטים היא:

$$1. \alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$$

$$2. (\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$$

$$3. (\neg\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\neg\alpha \rightarrow \neg\beta) \rightarrow \alpha)$$

$$4. (\forall x : (\alpha \rightarrow \beta)) \rightarrow (\forall x : \alpha \rightarrow \forall x : \beta)$$

$$5. \alpha \rightarrow \forall x : \alpha \text{ (כאשר } x \text{ אינו חופשי ב- } \alpha \text{)}$$

$$6. \forall x : \alpha \rightarrow \alpha(x|t) \text{ (כאשר } t \text{ הינו שם עצם ללא משתנים חופשיים)}$$

שהופכים להיות קשורים כאשר מציבים אותו במקום  $x$ )

האקסיומות הנ"ל הינן סכימות של נוסחאות. ניתן להציב כל נוסחא במקום  $\alpha, \beta, \gamma$  לעיל כדי לקבל נוסחת אקסיומה ספציפית.

## סמנטיקה

- תהי  $U$  קבוצת עצמים (עולם).
- פירוש  $I$  הוא פונקציה הממפה איברים של השפה לאיברים של הייצוג באופן הבא:
  1. הקבועים ממופים לאובייקטים בעולם.
  2. הפונקציות ממופות לפונקציות המתאימות בין  $n$ -יות של איברים בעולם לאיברים בעולם.
  3. הפרדיקטים ממופים ליחסים בעולם.
- השמה לכל המשתנים היא מיפוי של המשתנים החופשיים לאיברים ב- $U$ .

## ערך האמת של נוסחאות

- פונקצית הערכה של נוסחאות ממפה נוסחא ל-TRUE או FALSE:
- ערך האמת  $V$  של נוסחא  $\alpha$  תחת פירוש  $I$  מוגדר באופן רקורסיבי:
  - אם  $\alpha = P(t_1, t_2, \dots, t_n)$  נוסחא אטומית אזי:
    - \* אם  $\langle I(t_1), I(t_2), \dots, I(t_n) \rangle, I(P)$  אזי  $V(\alpha) = \text{TRUE}$ .
    - אחרת,  $V(\alpha) = \text{FALSE}$ .
  - אם  $\alpha = \neg\beta$  אזי  $V(\alpha)$  יקבע עפ"י טבלת האמת של  $\neg$  עבור  $V(\beta)$ .
  - אם  $\alpha = \beta \vee \gamma$  או  $\alpha = \beta \wedge \gamma$  או  $\alpha = \beta \rightarrow \gamma$  אזי  $V(\alpha)$  יקבע עפ"י טבלת האמת של הקשרים  $\rightarrow, \wedge, \vee$  בהתאמה עבור  $V(\beta)$  ו- $V(\gamma)$ .
  - אם  $\alpha = \forall x : \beta$  אזי:
    - אם לכל השמה של איבר מ- $U$  ב- $x$  נקבל  $V(\beta) = \text{TRUE}$ , אז  $V(\alpha) = \text{TRUE}$ .
    - אחרת,  $V(\alpha) = \text{FALSE}$ .
  - הערה:  $\exists x : \beta$  שקול ל:  $\neg\forall x : \neg\beta$ .

## ספיקות

- פירוש  $I$  (interpretation) והשמה  $V$  מספקים נוסחא אם"ם הנוסחא מקבלת ערך TRUE תחת הפירוש וההשמה.
- קבוצת פסוקים  $\Phi$  גוררת לוגית פסוק  $\alpha$  אם"ם כל פירוש והשמה שמשפטים את  $\Phi$  מספקים גם את  $\alpha$ . נסמן:  $\Phi \models \alpha$ .
- משפטי הנאותות והשלמות: נוסחא נובעת לוגית מקבוצת נוסחאות אם"ם היא יכיתה מתוכן:

$$\Phi \vdash \alpha \Leftrightarrow \Phi \models \alpha$$

- משפטי הנאותות והשלמות מקשרים בין סינטקס לסמנטיקה ומשמשים כלי לבדיקת גרירה לוגית.

## ייצוג ידע (Knowledge Representation)

- ייצוג עצמים:

Table (my\_desk)

Car (my\_suzuki)

- ייצוג תכונות של עצמים:

Num\_of\_legs(my\_desk,4)

Color (my\_suzuki, silver)

- ייצוג תכונות כלליות של עצמים:

$\forall x : [\text{Table}(x) \rightarrow \text{Num\_of\_legs}(x, 4)]$

- ייצוג יחסים בין עצמים:

Parent (avraham, izak)

On (coffee\_glass, my\_desk)

## ייצוג ידע - המשך

- ייצוג יחסים כלליים:

הגדרת יחס Above לפי קואורדינאטת גובה של עצמים:

$$\forall x \forall y [\text{Greater}(\text{z\_coord}(x), \text{z\_coord}(y)) \rightarrow \text{Above}(x, y)]$$

- ייצוג תכונות של יחסים:

טרנזיטיביות של יחס Above:

$$\forall x \forall y \forall z [\text{Above}(x, y) \wedge \text{Above}(y, z) \rightarrow \text{Above}(x, z)]$$

- ייצוג היררכיות:

$$\forall x : [\text{Work\_Table}(x) \rightarrow \text{Table}(x)]$$

$$\forall x : [\text{Table}(x) \rightarrow \text{Num\_of\_legs}(x, 4)]$$

$$\text{Work\_Table}(\text{my\_desk})$$

## ייצוג ידע - דוגמא

המירו את המשפטים הבאים לייצוג לוגי:

- Jack owns a dog.
- Every dog owner is an animal lover.
- No animal lover kills an animal.
- Either Jack or Curiosity killed the cat, who is named Tuna.
- Did Curiosity kill the cat?

## פרוצדורת הוכחה

- פרוצדורה שבהינתן משפט (נוסחא יכיחה) תמצא לו הוכחה.
- אם נוסחא אינה משפט אזי לא מובטח לנו שפרוצדורה כזו תעצור!

הפרוצדורה:

1.  $S \leftarrow \emptyset$ .

2. הוסף אקסיומה ל-  $S$  לפי מניה כלשהי של האקסיומות.

3. הפעל את כללי ההיסק על נוסחאות ב- $S$ .

4. הוסף את הנוסחאות החדשות ל- $S$ .

5. אם הנוסחא המבוקשת נמצאת ב- $S$ , החזר "כן".

6. אחרת, חזור ל-2.